

大腸がん

療法名	薬剤名	投与量	投与時間(分)、投与日数等	投与日	1コースの日数
FOLFIRI	レボホリナート イリノテカン 5FU 5FU	200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	120 120(レボホリナートと同時) 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
FOLFOXIRI	レボホリナート イリノテカン オキサリプラチン 5FU	200 mg/m ² 150 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ²	120 120(レボホリナートと同時) 120 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
mFOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン 5FU 5FU	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	120 120(レボホリナートと同時) 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
sLV5FU2	レボホリナート 5FU 5FU	200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	120 全開 46時間	day 1 day 1 day 1-2	14
IRIS(CPT11:125 biW)	イリノテカン S1	125 mg/m ² 80 mg/m ²	90 分2 14日分	day 1,15 day 1タ～	28
SOX	オキサリプラチン S1	130 mg/m ² 80 mg/m ²	120 分2 14日分	day 1 day 1タ～	21
XELOX	オキサリプラチン カペシタビン	130 mg/m ² C法	120 分2 14日分	day 1 day 1タ～	21
Bmab+FOLFIRI	アバスチン レボホリナート イリノテカン 5FU 5FU	5 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	90 (2回目以降30分まで短縮可) 120 120(レボホリナートと同時) 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Bmab+FOLFOXIRI	アバスチン レボホリナート イリノテカン オキサリプラチン 5FU	5 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 85 mg/m ² 2400 mg/m ²	90 (2回目以降30分まで短縮可) 120 120(レボホリナートと同時) 120 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Bmab+XELOX	アバスチン オキサリプラチン カペシタビン	7.5 mg/kg 130 mg/m ² C法	90 (2回目以降30分まで短縮可) 120 14日分	day 1 day 1 day 1タ～	21
Bmab+mFOLFOX6	アバスチン レボホリナート オキサリプラチン 5FU 5FU	5 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	90 (2回目以降30分まで短縮可) 120 120(レボホリナートと同時) 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Bmab+sLV5FU2	アバスチン レボホリナート 5FU 5FU	5 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	90 (2回目以降30分まで短縮可) 120 全開 46時間	day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Bmab+カペシタビン	アバスチン カペシタビン	7.5 mg/kg C法	90 (2回目以降30分まで短縮可) 14日分	day 1 day 1タ～	21
Bmab+IRIS(CPT11:125 biW)	アバスチン イリノテカン S1	5 mg/kg 125 mg/m ² 80 mg/m ²	90 (2回目以降30分まで短縮可) 90 分2 14日分	day 1,15 day 1,15 day 1タ～	28
Bmab+SOX	アバスチン オキサリプラチン S1	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ²	90 (2回目以降30分まで短縮可) 120 分2 14日分	day 1 day 1 day 1タ～	21
Bmab+ロンサーフ(TAS-102)	アバスチン ロンサーフ	5 mg/kg 70 mg/m ²	90 (2回目以降30分まで短縮可) 分2day1タ～5日分、day8タ～5日分	day 1,15 day 1,15 day 1タ～	28
Cmab単独	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1	7
Cmab+mFOLFOX6	アービタックス レボホリナート オキサリプラチン 5FU 5FU	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²) 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	60 (初回120) 120 120(レボホリナートと同時) 全開 46時間	day 1,8 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14
Cmab+XELOX	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8,15	21

	オキサリプラチン カペシタビン	130 mg/m ² C法	120 14日分	day 1 day 1タ～	
Cmab+FOLFIRI	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
Cmab+biweeklyCPT11	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8	14
	イリノテカン	150 mg/m ²	90	day 1	
Cmab+IRIS(CPT11:150 triW)	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1,8,15	21
	イリノテカン	150 mg/m ²	90	day 1	
	S1	80 mg/m ²	分2 14日分	day 1タ～	
エンコラフェニブ+Cmab	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1	7
	ビラフトビ	300 mg/body	分1 7日分	day 1-7	
エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cmab	アービタックス	250 mg/m ² (初回400 mg/m ²)	60 (初回120)	day 1	7
	ビラフトビ	300 mg/body	分1 7日分	day 1-7	
	メクトビ	90 mg/body	分2 7日分	day 1-7	
Pmab+FOLFIRI	ベクティビックス	6 mg/kg	60	day 1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
Pmab+mFOLFOX6	ベクティビックス	6 mg/kg	60	day 1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
Pmab+biweeklyCPT-11	ベクティビックス	6 mg/kg	60	day 1	14
	イリノテカン	150 mg/m ²	90	day 1	
Pmab単独	ベクティビックス	6 mg/kg	60	day 1	14
Rmab+FOLFIRI	サイラムザ	8 mg/kg	60	day 1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
AFL+FOLFIRI	ザルトラップ	4 mg/kg	60	day 1	14
	レボホリナート	200 mg/m ²	120	day 1	
	イリノテカン	150 mg/m ²	120(レボホリナートと同時)	day 1	
	5FU	400 mg/m ²	全開	day 1	
	5FU	2400 mg/m ²	46時間	day 1-2	
MSI-high大腸癌ニボルマブ	オプジーボ	240 mg/body	30以上	day 1	14